

Calendrier vaccinal de la vaccination de routine au Togo en 2025

Calendrier de vaccination chez les enfants de 0 à 23 mois et chez les jeunes filles de 9 ans			
Contact	Age	Vaccin / supplémentation/ Prophylaxie / Conseil	Maladies
1	A la naissance	BCG VPO0	Tuberculose Poliomyélite
2	A 6 semaines révolues	DTC-HepB-Hib1, VPO1, Rota1, Pneumo1	Poliomyélite Diphtérie Tétanos Coqueluche, Hépatite virale B Infections à Haemophilus influenzae type b Diarrhée à rota virus Infection à pneumocoque
3	A 10 semaines révolues	DTC-HepB-Hib2, VPO2 Rota2, Pneumo2 CPP1	Idem N°2 + Paludisme
4	A 14 semaines révolues	DTC-HepB-Hib3, VPO3, Pneumo3, VPI-1, CPP2	Idem N°2 excepté Diarrhée à rota virus
5	A 5 mois révolus	VAP 1	Paludisme
6	A 6 mois révolus	VAP 2/Vit A1	Paludisme/ Carence en vitamine A
7	A 7 mois révolus	VAP 3	Paludisme
8	A 9 mois révolus	RR1/VAA/ VPI2/ Vit A2 CPP 3	Rougeole- Rubéole Fièvre jaune/ Poliomyélite/ Carence en vitamine A/Paludisme
9	A 15 mois révolus	RR2/ CPP4/MenA/ VAP 4/ Vit A3	Rougeole- Rubéole/ Paludisme/ Méningite/ Carence en vitamine A
11	A 20 mois révolus	Vit A4/ Conseil sur l'ablactation progressive	Carence en vitamine A/ Malnutrition
12	Filles de 9 ans révolus	VPH	Virus de Papilloma Humain

Calendrier de vaccination antitétanique chez les femmes enceintes		
1	Au premier contact	Td1
2	4 semaines après Td1	Td2
3	6 mois après Td2	Td3
4	1 an après Td3	Td4
5	1 an après Td4	Td5

11-1- Doses, Ages, Maladies, sites et voies d'administration des vaccins de routine

Vaccin/ Ages d'administration	Maladies ciblées	Voie d'administration	Site
BCG (vaccin Bacille Calmette-Guérin); - à la naissance	Tuberculose	Intradermique	Face externe avant-bras gauche
VPO (vaccin antipoliomyélitique oral) - VPO0 : A la naissance - VPO1 : 6 semaines - VPO2 : 10 semaines - VPO3 : 14 semaines	Poliomyélite	Orale	Bouche
VPI (vaccin antipoliomyélitique inactivé) - VP1 : A 14 semaines - VPI : A 9 mois	Poliomyélite	Intramusculaire	Face externe de la cuisse droite
DTC-HepB-Hib (Penta) - Penta1 : 6 semaines - Penta2 :10 semaines - Penta3 :14 semaines	- Diphtérie, le -Tétanos et la - coqueluche, - l'hépatite B -Haemophilus influenza b	Intramusculaire	Face externe (région antéro latérale) de la cuisse gauche
Vaccin contre la pneumonie (PCV 13 ou Prévnar) - PCV 13-1 : 6 semaines - PCV 13-2 :10 semaines - PCV 13-3 : 14 semaines	Pneumonie	Intramusculaire	Face externe de la cuisse droite
Vaccin contre le Paludisme - VP1 : A 5 mois - VP2 : 6 mois - VP2 : 7mois - VP3 : 15 mois	Paludisme	Intramusculaire	Face externe de la cuisse gauche
Vaccin Antirougeoleux et antirubéoleux (RR) - A 9 mois - 15 mois	Rougeole et rubéole	Sous-cutanée	Bras gauche (haut du bras)
Vaccin Anti Amaril (VAA) - A 9 mois	Fièvre jaune	Sous-cutanée	Bras droit (haut du bras)
Rotarix - Rotarix 1 : 6 semaines - Rotarix 2 : 10 semaines	Diarrhée à rotavirus	Orale	Bouche
Vaccin Antitétanique diphtérique (Td) ou VAT - Aux femmes	Tétanos maternel et néonatal	Intramusculaire	Bras gauche (deltoïde)